

## جدول التطعيمات في كولومبيا البريطانية للرضع والأطفال

تبدأ مع بلوغ 4 سنوات (دخول روضة الأطفال)	18 شهراً	12 شهراً	6 أشهر	4 أشهر	شهران	اللقاح
		<input checked="" type="checkbox"/>				لقاح جديري الماء (الحماق) (#44b) <sup>1</sup>
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي والتهاب الكبد الوبائي من النوع ب وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-HB-IPV-Hib) (#105)
	<input checked="" type="checkbox"/>					اللقاح الخماسي المحسن ضد الخناق (الدفتيريا) والكزاز (التيتانوس) والسعال الديكي وشلل الأطفال والمستدمية النزلية من النوع ب (DTaP-IPV-Hib) (#15b)
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			لقاح التهاب الكبد الوبائي A (#33) لأطفال السكان الأصليين فقط
	<input checked="" type="checkbox"/>					لقاح الإنفلونزا المعطل (الخامل) (#12d) <sup>2</sup> سنوياً للأطفال من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات.
		<input checked="" type="checkbox"/>				اللقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR) (#14a)
<input checked="" type="checkbox"/>						اللقاح الرباعي الفيروسي (MMRV) ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجديري الماء (الحماق) (#14e) <sup>1</sup>
		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	اللقاح المقترن للمكورات السحائية C (#23a)
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح المكورات الرئوية المتقارن (PCV 13) (#62a)
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لقاح الروتا (الفيروس العجلي) (روتا تك RotaTeq®) (#104)
<input checked="" type="checkbox"/>						اللقاح الرباعي المحسن ضد الكزاز (التيتانوس) والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي وشلل الأطفال (Tdap-IPV) (#15a)

<sup>2</sup> يوصى بإعطاء لقاح الإنفلونزا مرة سنوياً وهو مجاني للأطفال من سن 6 أشهر وحتى 4 سنوات. يوصى بإعطاء جرعة ثانية بعد مرور 4 أسابيع على أخذ الجرعة الأولى للأطفال الذين يتلقون لقاح الإنفلونزا للمرة الأولى.

ملاحظة: يمكن لجدول التطعيمات أن يتغير. إذا كانت لديك أية استفسارات فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو اتصل بالرقم 1-8-1-8. وضع جدول التطعيمات وتمت مراجعة من قبل HealthLinkBC، ووزارة الصحة في كولومبيا البريطانية، ومركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض.

<sup>1</sup> لا يحتاج الأطفال الذين سبق لهم أن أصيبوا بجديري الماء أو الهربس النطاقي (الحزام الناري) عند سن عام فأكثر، بناءً على تأكيد الفحص المخبري، إلى لقاح جديري الماء، ولكن ينبغي عليهم أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) عند سن 4 سنوات.