

Le programme de vaccination de la Colombie-Britannique, enfants et nourrissons

Vaccin	2 mois	4 mois	6 mois	12 mois	18 mois	À partir de 4 ans (entrée à la maternelle)
Le vaccin contre la varicelle (n° 44b) ¹				<input checked="" type="checkbox"/>		
Le vaccin (DTCa-HB-VPI-Hib) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la poliomyélite et l'<i>Haemophilus influenzae</i> de type b (n° 105)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la polio et l'<i>Haemophilus influenzae</i> de type b (DCaT-VPI-Hib) (n° 15b)					<input checked="" type="checkbox"/>	
Le vaccin contre l'hépatite A (n° 33) Enfants autochtones seulement			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Vaccin inactivé contre l'influenza (grippe) (n° 12d) ²			<input checked="" type="checkbox"/> Annuellement pour les enfants de six mois à quatre ans			
Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) (n° 14a)				<input checked="" type="checkbox"/>		
Le vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle (RROV) (n° 14e) ¹						<input checked="" type="checkbox"/>
Le vaccin conjugué contre le méningocoque C (Men C) (n° 23a)	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Le vaccin conjugué contre le pneumocoque (VCP-13) (n° 62a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Le vaccin contre le rotavirus (RotaTeq®) (n° 104)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Le vaccin (DTCa-VPI) contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio (n° 15a)						<input checked="" type="checkbox"/>

Remarque : Le programme de vaccinations peut changer. Pour toute question, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé ou appelez le **8-1-1**. Ce tableau des vaccinations a été élaboré et révisé par HealthLinkBC, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique et le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.

¹ Les enfants qui ont eu la varicelle ou un zona à l'âge d'un an ou plus, selon le résultat d'un test de

laboratoire, n'ont pas besoin du vaccin contre la varicelle et ils devraient recevoir le vaccin ROR à l'âge de 4 ans.

² Il est recommandé de se faire vacciner chaque année contre la grippe. Ce vaccin est offert gratuitement aux enfants de 6 mois à 4 ans. Si l'enfant se fait administrer un vaccin contre la grippe pour la première fois, la seconde dose devrait être administrée 4 semaines après la première.